



Juego patológico asociado a alcoholismo: un estudio de comorbilidad.

Sánchez Peña, J. F. / Rodríguez Solano, J. J.

Introducción: El juego patológico se caracteriza por un déficit progresivo en el control del impulso a jugar. Se considera que la prevalencia del juego patológico en la población general fluctúa entre el 0,5 y el 2,5%. Diversos estudios han demostrado la comorbilidad del juego patológico en el alcoholismo.

Metodología: En nuestro trabajo se estudia a todos los pacientes atendidos en el programa de Alcoholismo del Servicio de Salud Mental de Puente de Vallecas (Madrid) entre los años 1997 y 2003. Estos son 547 pacientes diagnosticados según el DSM-IV-TR de “síndrome de dependencia etílica” y “abuso de alcohol”. De ellos se revisaron todas las historias clínicas para detectar todos los pacientes que cumplieran criterios de juego patológico, según DSM-IV-TR.

Resultados y Conclusiones: Se encuentra que el 15,72% (n = 86) de los pacientes con problemas de alcohol padece un trastorno por juego patológico. Se hace un análisis comparativo entre las dos muestras de pacientes con problemas de alcohol, jugadores y no jugadores, y se obtiene que los varones alcohólicos tienen un riesgo significativamente mayor que las mujeres alcohólicas de padecer ludopatía. El 62,8% de los jugadores tiene el descontrol del juego “dependiente” del consumo de alcohol. En nuestra población, el 83,7% de los alcohólicos jugadores son adictos a las máquinas “tragaperras”. Por tanto, siempre hay que indagar en un alcohólico si tiene problemas con el juego y en un ludópata si lo tiene con el alcohol.

Para acceder al texto completo consulte las características de suscripción de la fuente original: www.grupoaran.com/WEB/ediciones/revistas/002.asp?IR=26&f

Introduction: The pathological gambling is characterized by a progressive deficit in the control of the impulsive to gamble. It is estimated that the prevalence of the pathological gambling in the general population is from 0.5 to 2.5%. Several studies have demonstrated pathological gambling as comorbidity of alcoholism.

Methodology: In this paper are analysed all patients included in the Programme of Alcoholism of the Mental Healthcare Centre of the district of Vallecas, Madrid, between 1997 and 2003, accounting for 547 patients classified within the DSV-IV-TR as “ethylic dependency syndrome” and “alcohol abuse”, searching their clinical records for pathological gambling (as defined also by DSM-IV-TR).

Results and Conclusions: 15.72% (n = 86) of patients have pathological gambling comorbidity, being males at a higher risk than woman. In 62.8% of gamblers alcohol consumption cause pathological gambling. In our population 83.7% of alcoholic gamblers are addicts to slot machines. Finally it is always necessary to ask in the alcoholic people if they have problems with gambling and in the pathological gambling people if they have problems with the alcohol.

FUENTE: *Anales de Psiquiatría*, 2006
Revista OnLine Psiquiatría/Adicciones/Alcohol
<http://www.psiquiatria.com/articulos/adicciones/alcohol/30158/>

